


## Το ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ισχύει για το 84,6% του πληθυσμού



Μελετήσαμε το βαθμό εθισμού του ογκολογικού ασθενή με βάσει ερωτηματολόγιο διεθνούς αποδοχής Fagerstone Διαπιστώθηκε η επίδραση στο βαθμό εθισμού από τους κάτωθι παράγοντες σε ποσοστά:

- «πακέτα-έτη» 72,5%
- καπνιστική συνήθεια της οικογένειας 7%
- στάδιο της ασθένειας 6,5%
- καπνιστική συνήθεια των φίλων 6%
- αύξηση της πρόθεσης διακοπής του καπνίσματος 3,3%
- αύξηση της ηλικίας 1,7%
- αύξηση της ηλικίας έναρξης καπνίσματος 1,6%
- παρουσία νόσου 1,4%

Η ποσότητα και διάρκεια του καπνίσματος που αναφέρεται σαν «πακέτα-έτη» 72,5% επηρεάζει σε υψηλό ποσοστό τον βαθμό εθισμού και κατ'επέκταση το score Fagerstone θετικά δηλαδή όσο πιο πολύ καπνίζουμε τόσο πιο εθισμένοι είμαστε.

Οι υπόλοιποι παράγοντες επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό και διαφορετικό πρόσημο. Δηλαδή όταν καπνίζει η οικογένεια κατά 7% μειώνει την πιθανότητα να καπνίσουν ή να εθιστούν τα παιδιά στο κάπνισμα αλλά όταν καπνίζουν οι φίλοι αυξάνεται κατά 6% η πιθανότητα να εθιστούμε στο κάπνισμα.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, τα άτομα που ξεκίνησαν το κάπνισμα σε μεγαλύτερη ηλικία, και η παρουσία ογκολογικής νόσου επηρεάζουν σε μικρό ποσοστό 1-2% προκαλώντας μείωση του βαθμού εθισμού του καπνιστή.